

로이나제주 조제 시 주의사항

● 재구성 및 희석 용매

- 1) 재구성: 재구성 용매(1차 용매)는 반드시 주사용수를 사용해야 합니다.
- 2) 희석: 희석 용매(2차 용매)는 반드시 생리식염수 또는 5% 포도당 주사액을 사용해야 합니다.

● 조제 방법

- 1) 주사액 조제시 로이나제 주를 먼저 주사용수 2~5mL에 용해하십시오.
- 2) 주사용수에 용해한 로이나제 주를 생리식염수나 포도당주사액의 2차 용매 200~500mL에 희석한 후 점적 정주로 투여하십시오. 희석 시 세게 주입하지 말고, 천천히 주입하여 희석하십시오.
- 3) 근육주사시 심한 통증이 유발될 수 있으므로 가능한 점적 정주를 이용하시기 바랍니다.
- 4) 재구성 시 본 제를 주사용수에 용해하지 않고 생리식염수 및 기타 용매에 직접 용해할 경우, 백탁부유물이 생성될 수 있습니다.
- 5) 용해 후 단시간 내에 부유물이 생성될 수 있으므로 사용 직전에 용해하시기 바랍니다.
- 6) 본 제는 1회 투여용이므로 분할 사용하지 마십시오.